

## Flusso di presentazione ai genitori della vaccinazione contro i rotavirus

Stile sociale N. 3

Durata stimata: cronometrato 2' 30"

Fase	Testo
Innesco	Oggi parliamo di vaccinazioni, e in particolare di quella contro la gastroenterite da rotavirus. È mio preciso dovere farvi capire perché è importante. <b>Lei sa che cos'è la gastroenterite?</b>
Risposta della Madre	Mmm, no, non ne ho sentito parlare molto ...
Intro problema	<b>La gastroenterite è un'infezione dello stomaco e dell'intestino, solitamente infettiva. La gastroenterite da rotavirus è la forma più grave,</b> e colpisce praticamente tutti i bambini sotto i 2 anni. I sintomi sono vomito e diarrea persistente e possono portare alla disidratazione. In quel caso è necessario il ricovero, anche di diversi giorni. Inutile che le sottolinei le ripercussioni sul bambino e sulla famiglia, il disagio fisico, le preoccupazioni, la perdita di giorni di lavoro. Tutte cose che si possono e si devono evitare.
Soluzione	La soluzione più efficace e sicura è il vaccino. I dati parlano chiaro: nel Regno Unito 77% di casi in meno. In Italia, la Sicilia ha ridotto del 48% le ospedalizzazioni per rotavirus.
Come funziona	Questa vaccinazione non è obbligatoria, ma è raccomandata come quelle per la meningite ed è giusto farla. E' orale, così facciamo una iniezione in meno, e di solito viene somministrata in concomitanza con i due vaccini iniettabili, l'esavalente e lo pneumococco, per evitare ulteriori sedute vaccinali.
Interazione della Madre	<b>Mi scusi, ci possono essere effetti collaterali?</b>
Eventi avversi e come li gestiremo	La tollerabilità del vaccino contro il rotavirus di solito è ottima. Possono presentarsi un po' di febbre o qualche scarica di vomito o diarrea, ma molto più leggeri di quelli che si avrebbero con la malattia. Una sola accortezza: osservare con un po' più di attenzione il bambino durante la prima-seconda settimana dopo la vaccinazione, cosa che peraltro si dovrebbe fare sempre.

	<b>C'è infatti una bassissima probabilità di invaginazione intestinale, una forma di occlusione intestinale.</b>
<b>Interazione della Madre</b>	<b>Ha detto occlusione intestinale?</b>
<b>Eventi avversi e come li gestiremo - Il Parte</b>	<p><b>Sì, parliamo di 1,5 casi ogni 100.000 vaccinazioni – in pratica 6 potenziali casi su 400.000 mila nati in Italia in un anno.</b></p> <p>Comunque, se il bambino piange di continuo e manifesta gonfiore addominale, vomito, febbre elevata, o se nota striature rosse nelle feci, come se ci fosse del sangue, mi telefoni subito, e se non dovesse trovarmi vada al pronto soccorso. Sia chiaro che l'invaginazione è una condizione medica che può presentarsi a prescindere dalla vaccinazione. Proprio per ridurre ulteriormente il rischio già basso, è bene vaccinare precocemente.</p>
<b>Call to action</b>	<p>Per procedere occorre rispettare i tempi previsti dalla lettera di chiamata della ASL. In alternativa, potremo eseguire la vaccinazione nel mio studio.</p> <p>Ha delle domande?</p>